

Poly-HF

Méthode

- Essai : phase II, randomisé, ouvert
- Molécule : polypill (metoprolol 25/50/100/150 + empagliflozine 10 + spironolactone 12,5) mais sans IEC pour faciliter la prise d'ARNi (qui se prend en deux fois).
- Population étudiée : FEVG < 40%, et sans traitement médical optimal.

Résultats

- Caractéristiques : 475 patients screenés, 212 inclus. et finalement 36 étudiés. Plutôt des hommes, 53 ans, 53% afro-américains et 39% hispaniques. 78% sans assurance, 53% chômage. FEVG 24%. NT pro BNP 1432.
- Données quantitatives : 58% des patients prenaient > 6 médicaments par jour. 64% des patients étaient frustrés du nombre de médicaments pris, la moitié avait déjà oublié des prises de médicaments (44% par oubli, 22% à cause du cout, 27% à cause des effets secondaires potentiels). 88% étaient intéressés à ne recevoir qu'une pilule pour les 3 médicaments, et 83% ont pensé que ça allait les aider dans leurs soins.

From:

<https://clementbecle.fr/> - cb_cardio



Permanent link:

<https://clementbecle.fr/doku.php?id=poly-hf>

Last update: **2025/11/09 18:01**